

获得疫苗的渠道：

- 您的医疗保健提供者处。
- 在一些药店。
- 也可通过预约，在穆鲁玛郡卫生部成人和儿童服务机构获取。致电 503-988-3406 或访问 www.multco.us/health/immunizations。

接种麻疹疫苗是安全的。

- 接种麻疹疫苗、腮腺炎疫苗和风疹疫苗是非常安全的。
- 可能发生轻微副作用，包括局部疼痛、发烧、轻微皮疹和轻微肿胀。
- 严重的副作用和过敏反应是非常罕见的。
- 儿童疫苗中不含汞。



穆鲁玛郡 卫生部 传染病服务

426 SW Stark Street
3 楼 (Third Floor)
Portland, Oregon 97204

电话 503.988.3406
传真 503.988.3407

<https://multco.us/health/immunizations>



麻疹

不只是一点皮疹

- 麻疹是一种病毒性疾病，容易传染。
- 麻疹可能是危险的，尤其对婴儿和小孩来说。
- 四分之一患麻疹的人需要去医院。
- 三分之一麻疹患者会出现问题，如耳部感染、肺部感染，极少数情况下会出现大脑肿胀。
- 每 1000 名患麻疹的儿童中会有一至两名失去生命。



麻疹症状

- 发烧
- 咳嗽、流鼻涕
- 眼睛发红
- 红色皮疹自头部和面部开始，并扩散到身体其他部位。
- 症状通常在一到两周内出现。极少数情况下，出现症状需要最多四周时间。

麻疹如何传播

- 当携带病毒的人咳嗽或打喷嚏时，麻疹就会传播。此外，也会通过直接接触麻疹病人的鼻子或咽喉粘液（鼻涕）而感染。




人们在发病前就能传播麻疹。

从未接种过麻疹疫苗或患过麻疹的人，如果接近患有麻疹的人，有 90% 的机率感染此疾病。从皮疹出现前四天到出现后四天，麻疹都会从人到传播。

请先致电

如果您认为您的孩子得了麻疹，请先致电诊所或急救中心，以避免病毒传播。



符合以下情况则不会患上麻疹：

- 四岁以下，曾接种过一次麻疹、腮腺炎和风疹疫苗。
- 四岁或四岁以上，曾接种过两次麻疹疫苗。
- 您在 1957 年前出生。
- 验血结果表明您不会患上麻疹。

保护您的孩子

- 首次接种麻疹疫苗需在 12 至 15 个月时进行。
- 第二次接种麻疹疫苗需在 4 至 6 岁时进行。