


Encuentre una vacuna:

- Con su proveedor de atención de la salud.
- En algunas farmacias.
- Departamento de Salud del Condado de Multnomah para adultos y niños, previa cita. Llame al **503-988-3406** o visite **www.multco.us/health/immunizations**.

La vacuna contra el sarampión es segura.

- La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola es muy segura.
- Pueden ocurrir efectos secundarios leves; estos incluyen dolor en el sitio de la inyección, fiebre, un sarpullido leve e inflamación leve.
- Los efectos secundarios severos y las alergias son muy raros.
- Las vacunas infantiles no contienen mercurio.



Departamento de Salud del Condado de Multnomah

Servicio de Enfermedades Transmisibles

426 SW Stark Street
Tercer piso (Third Floor)
Portland, Oregon 97204

Tel. **503.988.3406**
Fax. **503.988.3407**


<https://multco.us/health/immunizations>



Sarampión.

No es solo un pequeño sarpullido

- El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente de persona a persona.
- El sarampión puede ser peligroso, especialmente para los bebés y niños pequeños.
- Una de cada cuatro personas con sarampión necesitará ir al hospital.
- Una de cada tres tendrá problemas tales como infección de oído, infección pulmonar, y en raros casos, inflamación del cerebro.
- Por cada 1,000 niños con sarampión, uno o dos morirán.



Síntomas del sarampión

- Fiebre
- Tos y escurrimiento nasal
- Ojos rojos
- Un sarpullido rojo que comienza en la cabeza y rostro y se extiende al resto del cuerpo.
- Los síntomas usualmente se desarrollan dentro de una o dos semanas. En casos raros, puede tomar hasta cuatro semanas para que comiencen los síntomas.

Cómo se transmite el sarampión

- El sarampión se transmite cuando alguien que tiene el virus tose o estornuda. También puede contagiarse a través del contacto directo con el moco nasal o de la garganta de alguien con sarampión.




Las personas pueden transmitir el sarampión antes de enfermarse.

Una persona que nunca ha recibido una vacuna contra el sarampión o que nunca se ha enfermado de sarampión tiene un 90 por ciento de posibilidades de contraer la enfermedad si se encuentra cerca de una persona con sarampión. Las personas pueden transmitir el sarampión durante cuatro días antes de que aparezca el sarpullido y hasta cuatro días después.

Primero llame

Si cree que su hijo(a) tiene sarampión, primero llame a su clínica o a Urgencias para evitar el contagio del virus a otras personas.



Usted está protegido contra el sarampión si:

- Tiene menos de cuatro años de edad y ha recibido una dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola.
- Tiene cuatro años o más y ha recibido dos vacunas contra el sarampión.
- Nació antes de 1957.
- Cuenta con un examen de sangre que muestra que usted está protegido contra el sarampión.

Proteja a su hijo

- La primera dosis de la vacuna contra el sarampión debe ser administrada entre los 12 y 15 meses de edad.
- La segunda dosis, entre los 4 y 6 años de edad.